

Doktorze, nie daj szansy AIDS, pomyśl o HIV!



Znam rekomendacje PTN AIDS
Zalecam test na HIV

Test na HIV należy rozważyć w przypadku każdej choroby przebiegającej nietypowo, niepoddającej się leczeniu lub nawracającej, a także¹:

Stomatologia

- nawracająca drożdżycza jamy ustnej i przełyku
- zmiany dysplastyczne błony śluzowej jamy ustnej
- zakażenie HPV
- nawracające, opryszczkowe zapalenie jamy ustnej
- zakażenia przenoszone drogą płciową
- chłoniak Burkitta
- mięsak Kaposiego
- leukoplakia włochata

Ginekologia

- ciąża – kobieta i jej partner – w razie braku badania test należy zaoferować po porodzie, a jeśli kobieta nie wyrazi zgody, należy zaproponować badanie noworodka
- nawracająca drożdżycza pochwy
- zakażenia przenoszone drogą płciową
- inwazyjny i nieinwazyjny rak szyjki macicy
- dysplazja szyjki macicy > 2 stopnia
- zakażenie HPV

Nefrologia/urologia

- nefropatie kłębuszkowe
- choroby przenoszone drogą płciową
- brodawczak pęcherza moczowego
- nasieniak (seminoma)

Pediatrica/neonatologia

- wszystkie noworodki urodzone przez kobiety, które nie poddały się badaniu przed ciążą lub podczas jej trwania
- zapalenie ślinianek niejasnego pochodzenia
- ciężkie zakażenia bakteryjne
- nawracająca kandydoza jamy ustnej
- zapalenie płuc wywołane *Pneumocystis jirovecii* (dawniej *P. carinii*)
- gruźlica
- zakażenie cytomegalowirusowe
- śródmiąższowe zapalenie płuc
- nawracające bakteryjne zapalenie płuc,
- encefalopatia niejasnego pochodzenia
- upośledzenie rozwoju psycho-ruchowego
- limfadenopatie niejasnego pochodzenia
- małopłytkowość
- zapalenie siatkówki o etiologii zakaźnej

Neurologia

- pojedyncze ropnie mózgu
- toksoplazmoza mózgu
- encefalopatia o niejasnej etiologii
- PML
- kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
- postępujące otępienie
- polineuropatia
- chłoniak pierwotny mózgu
- zespół Guillain-Barre
- poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego
- aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Okulistyka

- zapalenie błony naczyniowej i siatkówki (CMV, HSV, toksoplazmozowa, inne)
- retinopatie niejasnego pochodzenia
- półpasiec nawracający

Onkologia/hematologia

- chłoniaki nieziarnicze
- rak/dysplazja nabłonkowa odbytu/szyjki macicy
- rak płuc
- nasieniak (seminoma)
- ziarnica złośliwa
- choroba Castelmanna
- limfopatie niejasnego pochodzenia
- małopłytkowość, neutropenia, limfopenia

Choroby wewnętrzne

- gorączka o niejasnej etiologii
- utrata masy ciała o niejasnej etiologii
- obniżenie stężenia hemoglobiny o niejasnej etiologii
- trombocytopenia i/lub leukopenia o niejasnej etiologii
- drożdżycza przełyku i żołądka
- przewlekła biegunka
- zapalenie jelit o niejasnej etiologii
- nawracające bakteryjne zapalenie płuc
- śródmiąższowe zapalenie płuc
- limfadenopatie
- zespół wyniszczenia niejasnego pochodzenia

Choroby zakaźne

- półpasiec zajmujący > 2 dermatomy/nawracający
- gorączka o niejasnej etiologii
- zaburzenia hematologiczne
- drożdżycza układu oddechowego, pokarmowego
- zespół mononukleozopodobny²
- przewlekła biegunka
- nawracające zapalenie płuc
- toksoplazmoza OUN
- kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
- aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
- gruźlica, inne mykobakteriozy
- wirusowe zapalenia wątroby: HCV, HBV, HAV
- inne choroby z listy chorób wskaźnikowych AIDS

Laryngologia

- zapalenie ślinianek o niejasnej etiologii
- nowotwory okolicy głowy i szyi
- grzybica jamy ustnej, przełyku lub krtani
- limfadenopatia niejasnego pochodzenia

Pulmonologia

- mykobakteriozy płucne lub rozsiane
- nawracające bakteryjne zapalenia płuc
- śródmiąższowe zapalenie płuc
- zapalenia płuc o niejasnej etiologii
- drożdżycza tchawicy i/lub oskrzeli
- aspergiloza

Dermatologia

- zakażenia przenoszone drogą płciową
- łojotokowe zapalenie skóry
- nawracająca drożdżycza jamy ustnej
- półpasiec
- mięsak Kaposiego
- nowotwory skóry

Endokrynologia

- zaburzenia endokrynologiczne o niejasnej etiologii

¹Wnuk A, Szełeta B, Bander D. Zasady testowania w kierunku HIV – zalecenia. W: Zasady opieki nad osobami zakażonymi HIV. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, 2013. PTN AIDS, Warszawa, 2013. Coroczne aktualizacje zaleceń udostępniane są na stronie Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS: <http://www.ptnaids.pl>, w zakładce „Rekomendacje”.

²zespół mononukleozopodobny (rzekomogrypowy) może występować w początkach zakażenia HIV, przed pojawieniem się przeciwciał anti-HIV – ujemny wynik w czasie trwania tych zespołów nie wyklucza zakażenia HIV; badanie trzeba powtórzyć po 3 miesiącach.